Betadine 10% maść 20g

Cena: 19,88 pln

Opis słownikowy

Dawka	100 mg/g
Opakowanie	20 g
Pojemność	20 g
Postać	MAŚĆ
Producent	EGIS PHARMACEUTICALS PLC
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Polyvidonum

Opis produktu

Opis:
Lek Betadine stosuje się w miejscowym leczeniu uszkodzeń i zakażeń skóry.

Działanie:
Substancja czynna leku powidon jodowany to połączenie jodu i polimeru poliwinylopyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po zastosowaniu leku Betadine uwalnia się jod. Wolny jod ma silne właściwości bakteriobójcze, działa też na wirusy, grzyby, a także niektóre pierwotniaki.

Wskazania:
Lek ten jest wskazany w miejscowym leczeniu:
oparzeń,
ran,
otarć,
owrzodzeń troficznych,
zakażeń skóry.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Betadine:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadczynność tarczycy i inne jawne choroby tarczycy.
Oryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa).
Przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
Rzadko występujące objawy niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
reakcje nadwrażliwości, kontaktowe zapalenie skóry (z takimi objawami jak zaczerwienienie, niewielkie pęcherze i świąd).
Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
reakcja anafilaktyczna,
obrzęk naczynioruchowy,
nadczynność tarczycy (nadmierna aktywność tarczycy powodująca, między innymi zwiększenie apetytu, zmniejszenie masy ciała, poty, szybsze bicie serca lub niepokój ruchowy.)
Objawy niepożądane o nieznanej częstości występowania:
niedoczynność tarczycy po dłuższym lub intensywniejszym stosowaniu leku,
zaburzenia czynności nerek.

Dawkowanie:
Lek ten należy zawsze stosować dokladnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W leczeniu zakażeń maść nakłada się raz lub dwa razy na dobę.

Sposób podawania:
Podanie na skórę.
Skórę zmienioną chorobowo należy oczyścić i osuszyć.
Na zmienioną chorobowo skórę nakładać maść.
Można założyć opatrunek lub bandaż.
Lek stosować maksymalnie przez 14 dni.

Skład:
Substancją czynną leku jest powidon jodowany (Povidonum iodinatum).
1 g maści zawiera 100 mg kompleksu jodowanego powidonu.
Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, makrogol 400, makrogol 4000, makrogol 1000, makrogol 1500, woda oczyszczona.

Podmiot odpowiedzialny:
EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.