

# Braunovidon maść 0,1 g/g 100 g

Cena: 62,50 pln



## Opis słownikowy

Dawka	100 mg/g
Opakowanie	100 g
Pojemność	100 g
Postać	MAŚĆ
Producent	BRAUN MELSUNGEN AG
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Polyvidonum

## Opis produktu

### Opis:

Braunovidon to lek w postaci maści na skórę o działaniu dezynfekującym. Braunovidon stosuje się między innymi przy oparzeniach skóry płomieniem albo gorącym płynem, zakażonych owrzodzeniach, odleżynach czy ropnych zmianach skórnych.

### Ważne informacje:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się na skórę, na całą zmienioną chorobowo jej powierzchnię.

Czas stosowania leku zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Maść może pozostawać na skórze przez długi czas. Opatrunek należy zmienić w momencie odbarwienia brązowego koloru maści.

### Działanie:

Braunovidon działa dezynfekująco.

### Wskazania:

Braunovidon stosuje się przy:

oparzeniach skóry płomieniem lub gorącym płynem,

na zakażone owrzodzenia, odleżyny,

zakażonych powierzchownych ubytkach skóry, które nie wykazują tendencji do gojenia się z odczynem zapalnym lub głębszym owrzodzeniem,

ropnych zmianach skórnych (pyodermia),

bakteryjnych lub grzybiczych chorobach skóry,

względnie wtórne zakażenia tym samym czynnikiem uprzednio wyleczone.

**Przeciwwskazania:**

Kiedy nie stosować leku Braunovidon:  
jeśli pacjent ma uczulenie na powidon jodowany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
w chorobie tarczycy,  
w przypadku zespołu opryszczkowego zapalenia skóry,  
w razie planowania lub niedawno zakończonej terapii radioaktywnym izotopem jodu (do czasu zakończenia terapii),  
u noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Dawkowanie:**

kilka razy dziennie smarować maścią powierzchnię skóry wymagającą leczenia - w początkowej fazie leczenia, dla utrzymania optymalnego działania bakteriobójczego, maść należy nakładać co 4-6 godzin na zakażoną lub sączącą się ranę.

**Skład:**

Substancją czynną jest powidon jodowany (Povidonum iodatum) z 10% zawartością dostępnego jodu.  
100 g maści zawiera 10g powidonu jodowanego.  
Substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 4000, woda oczyszczona, sodu wodorowęglan.  
Brazowy kolor maści jest cechą charakterystyczną produktu leczniczego i świadczy o jego skuteczności, dzięki obecności dostępnego jodu.

**Podmiot odpowiedzialny:**

BRAUN MELSUNGEN AG

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.