

Diosminex 500mg 60 tabletek



Cena: 34,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Diosminum

Opis produktu

Opis:

Diosminex leczy objawy związane z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych. Zawiera zmikronizowaną diosminę, substancję o szerokim spektrum działania i dobrym profilu bezpieczeństwa. Mikronizacja zwiększa rozpuszczalność diosminy i przez to przyspiesza jej metabolizowanie do diosmetyny, co wpływa znacząco na biodostępność diosminy i lepsze wchłanianie z przewodu pokarmowego.

Diosmina zawarta w Diosminex leczy objawy PNŻ (przewlekłej niewydolności żylnnej), gdyż przyspiesza odpływ krwi żylnnej i zmniejsza jej zastój w żyłach, poprawia napięcie ścian naczyń żylnych, wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejsza podatność małych naczyń krwionośnych na pęknięcie, zmniejsza obrzęki.

Wskazania:

Diosminex jest wskazany w leczeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnnej u osób dorosłych, jak:
żylaki kończyn dolnych • owrzodzenia żyłne • teleangiektazje (pajęczki) i żylaki/żyły siatkowate
uczucie ciężkości nóg, zmęczenie, dyskomfort lub uczucie niespokojnych nóg
ból lub uczucie pieczenia nóg
uczucie zimnych nóg
nocne skurcze nóg
obrzęk kończyn dolnych
swędzenie i parestezje (mrowienie, kłucie lub swędzenie skóry kończyn dolnych)
zaczerwienienie (rumień) lub zasinienie skóry.

Diosminex jest stosowany w monoterapii w początkowych stopniach zaawansowania przewlekłej niewydolności żylnnej lub jako uzupełnienie innych terapii we wszystkich stopniach zaawansowania niewydolności żylnnej (C0 – C6 wg klasyfikacji CEAP).

Lek Diosminex jest wskazany w leczeniu nasilonych dolegliwości związanych z żylakami odbytu u osób dorosłych.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie przyjmować leku Diosminex:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Dzieci:

Lek jest zalecany dla dorosłych powyżej 18 lat.

Dawkowanie:

Zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, po jednej rano i wieczorem podczas posiłków.

Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żyłaków odbytu: 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Nie stosować większej dawki leku niż zalecana.

Skład:

Co zawiera Diosminex:

Substancją czynną leku jest diosmina. Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg diosminy (w postaci zmikronizowanej).

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka: talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, żółcień chinolinowa, lak (E 104), indygotyna, lak (E 132), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), żelaza tlenek czarny (E 172)

Podmiot odpowiedzialny:

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24,
D24PPT3 Irlandia

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.