

Flegtac Kaszel syrop 1,6mg/ml x 125ml



Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

Dawka	1, 6 mg/ml
Opakowanie	125 ml (but.)
Pojemność	125 ml
Postać	SYROP
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Bromhexinum

Opis produktu

Wskazania:

Flegtac Kaszel 1,6 mg/ml jest lekiem w postaci syropu wskazanym do stosowania w przypadku ostrego i przewlekłego schorzenia dróg oddechowych przebiegającego z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 2. roku życia i osób dorosłych.

Właściwości:

Jako substancję czynną syrop Flegtac Kaszel zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który wykazuje działanie wykrztuśne poprzez upłynnianie wydzieliny z dróg oddechowych. To ułatwia rzęskom (drobnym włoskom wyściełającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie jej z płuc. Bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie i wykazuje działanie łagodzące kaszel. Flegtac Kaszel 1,6 mg/ml wydawany jest bez recepty i charakteryzuje go wiśniowy smak.

Skład:

1 ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły niekrystalizujący (E420), glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2-metylo-4-piron, aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy)

Stosowanie:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę.

Dzieci i młodzież:

Dzieci w wieku powyżej 12. roku życia: 1 pełna łyżka miarowa trzy razy na dobę. Maksymalnie do 30 ml na dobę.

Dzieci między 6. a 12. rokiem życia: 2,5 ml trzy razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę.

Dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 1,25 ml trzy razy na dobę. Maksymalnie do 5 ml na dobę.

Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Nie wymaga rozcieńczenia.

Ważne informacje:

Flegtac Kaszel jest niewskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Nie nadaje się do stosowania przez pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy oraz dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Podmiot odpowiedzialny:

TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą