

Naxii 220mg 20 tabletek

Cena: 20,52 pln



Opis słownikowy

Dawka	220 mg
Opakowanie	20 tabl. (blis.)
Postać	tabl.powl.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Naproxenum

Opis produktu

Opis:

Lek Naxii zawiera substancję naproksen sodowy, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie bólów różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym:

- bóle stawowe
 - bóle pleców
 - bóle mięśniowe
 - ból zębów
 - ból głowy
 - bolesne miesiączkowanie
 - dolegliwości bólowe o niewielkim nasileniu związane z przeziębieniem.
- Obniżenie gorączki.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Naxii:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli w przeszłości po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiła astma oskrzelowa, pokrzywka lub reakcja typu alergicznego.
- Jeśli po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub doszło do przebiccia ściany przewodu pokarmowego.
- Jeśli u pacjenta występuje czynna lub niedawno przeżyta choroba wrzodowa żołądka

i dwunastnicy.

- Jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek.
- Jeśli kilkakrotnie stwierdzono owrzodzenie przewodu pokarmowego lub krwawienie z owrzodzenia w wywiadzie.
- W trzecim trymestrze ciąży.

Dzieci:

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat.

Dawkowanie:

Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat:

Jednorazowo 1 tabletkę (220 mg) co 8 do 12 godzin do ustąpienia objawów.

U niektórych osób zastosowanie dawki początkowej 2 tabletki (440 mg), a następnie 1 tabletkę (220 mg) po upływie 12 godzin może spowodować zwiększenie działania przeciwbólowego.

Nie wolno przekraczać dawki dobowej 660 mg (3 tabletki), chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Skład:

Co zawiera lek Naxii

- Substancją czynną leku jest naproksen sodowy.

- Pozostałe substancje pomocnicze to:

skład rdzenia: talk, powidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna;

skład otoczki: Opadry Light Blue YS-2-10657 (hydroksypropylometyloceluloza, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171) i lak aluminiowy z indygotyną).

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.