

Ulgix Wzdęcia Baby emulsja doustna 40 g



Cena: 25,87 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Pojemność	40 g
Postać	emul.doust.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Ulgix WZDĘCIA BABY stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych z nagromadzeniem gazów w jelitach takich jak: wzdęcia brzucha oraz kolka jelitowa u niemowląt, a także pomocniczo przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej technika obrazowa (USG, RTG, endoskopia) w celu usunięcia gazów i powietrza.

Substancją czynną Ulgix WZDĘCIA BABY jest symetykon, który posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach. W ten sposób ułatwia ich pękanie i rozbijanie, co usprawnia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów i powietrza w przewodzie pokarmowym, przynosząc ulgę od wzdęć.

Ulgix WZDĘCIA BABY to emulsja doustna z symetykonem o smaku waniliowo-bananowym, w zestawie ze strzykawką dozującą, która umożliwia precyzyjne dawkowanie. Produkt nie zawiera alkoholu i sztucznych barwników.

Skład:

Substancja czynna: symetykon – 1 ml zawiera 147mg symetykonu, 0,14ml zawiera 20mg symetykonu. Substancje pomocnicze: karboksymetyloceluloza sodowa, parahydroksybenzoesan metylu, aromat bananowy, aromat waniliowy, sacharyna sodowa, cyklaminian sodu, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia do 2 roku życia 20 mg symetykonu (0,14 ml) 4 razy dziennie
Dzieci powyżej 2 roku życia do 6 roku życia 40 mg symetykonu (0,28 ml) 4 razy dziennie
Dzieci powyżej 6 roku życia do 14 roku życia 40–80 mg symetykonu (0,28 ml–0,56 ml) 3–5 razy dziennie
Dzieci powyżej 14 roku życia i dorośli 80 mg symetykonu (0,56 ml) 3–5 razy dziennie

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.